

Mindestlängen, Schonzeiten und Angelzeiten für die CZ

Mindestlängänge für Fische in ausgewiesenen Forellenregionen/-gewässern:

| | | |
|--|--------|-------------------|
| a) bolen dravý (<i>Aspius aspius</i>) | 40 cm, | Rapfen |
| b) candát obecný (<i>Stizostedion lucioperca</i>) | 45 cm, | Zander |
| c) hlavatka obecná (podunajská) (<i>Hucho hucho</i>) | 65 cm, | Huchen |
| d) jelec jesen (<i>Leuciscus idus</i>) | 25 cm, | Aland |
| e) jelec tloušť (<i>Leuciscus cephalus</i>) | 25 cm, | Döbel |
| f) jeseter malý (<i>Acipenser ruthenus</i>) | 30 cm, | Sterlet |
| g) kapr obecný (<i>Cyprinus carpio</i>) | 35 cm, | Karpfen |
| h) lín obecný (<i>Tinca tinca</i>) | 20 cm, | Schleie |
| i) lipan podhorní (<i>Thymallus thymallus</i>) | 30 cm, | Äsche |
| j) ostroretka stěhovavá (<i>Chondrostoma nasus</i>) | 30 cm, | Nase |
| k) parma obecná (<i>Barbus barbus</i>) | 40 cm, | Barbe |
| l) podoustev říční (nosák) (<i>Vimba vimba</i>) | 25 cm, | Russnase |
| m) pstruh duhový (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) | 25 cm, | Regenbogenforelle |
| n) pstruh obecný (<i>Salmo trutta</i>) | 25 cm, | Bachforelle |
| o) siven americký (<i>Salvelinus fontinalis</i>) | 25 cm, | Bachsaiibling |
| p) sumec velký (<i>Silurus glanis</i>) | 70 cm, | Wels |
| q) štika obecná (<i>Esox lucius</i>) | 50 cm, | Hecht |
| r) úhoř říční (<i>Anguilla anguilla</i>) | 45 cm, | Aal |
| s) mník jednovousý (<i>Lota lota</i>) | 30 cm, | Quappe |
| t) losos obecný (atlantský) (<i>Salmo salar</i>) | 50 cm, | Lachs |
| u) amur bílý (<i>Ctenopharyngodon idella</i>) | 50 cm. | Grasskarpfen |

Mindestlänge für Fische in Nichtforellenregionen/-gewässern:

| | | |
|--|--------|-------------------|
| a) hlavatka obecná (podunajská) (<i>Hucho hucho</i>) | 65 cm, | Huchen |
| b) jelec jesen (<i>Leuciscus idus</i>) | 25 cm, | Aland |
| c) jeseter malý (<i>Acipenser ruthenus</i>) | 30 cm, | Sterlet |
| d) kapr obecný (<i>Cyprinus carpio</i>) | 35 cm, | Karpfen |
| e) lín obecný (<i>Tinca tinca</i>) | 20 cm, | Schleie |
| f) lipan podhorní (<i>Thymallus thymallus</i>) | 30 cm, | Äsche |
| g) ostroretka stěhovavá (<i>Chondrostoma nasus</i>) | 30 cm, | Nase |
| h) parma obecná (<i>Barbus barbus</i>) | 40 cm, | Barbe |
| i) podoustev říční (nosák) (<i>Vimba vimba</i>) | 25 cm, | Russnase |
| j) pstruh duhový (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) | 25 cm, | Regenbogenforelle |
| k) pstruh obecný (<i>Salmo trutta</i>) | 25 cm, | Bachforelle |
| l) siven americký (<i>Salvelinus fontinalis</i>) | 25 cm, | Bachsaiibling |
| m) mník jednovousý (<i>Lota lota</i>) | 30 cm, | Quappe |
| n) losos obecný (atlantský) (<i>Salmo salar</i>) | 50 cm, | Lachs |
| o) amur bílý (<i>Ctenopharyngodon idella</i>) | 50 cm. | Grasskarpfen |

Angelzeiten für Forellenregionen/-gewässern:

| Monat | Uhrzeit |
|---------------------|--|
| Januar , Februar | von 7 ^o Uhr bis 17 ^o Uhr |
| März | von 6 ^o Uhr bis 18 ^o Uhr |
| April | von 6 ^o Uhr bis 20 ^o Uhr |
| Mai | von 6 ^o Uhr bis 21 ^o Uhr |
| Juni und Juli | von 5 ^o Uhr bis 22 ^o Uhr |
| August | von 6 ^o Uhr bis 22 ^o Uhr |
| September | von 7 ^o Uhr bis 20 ^o Uhr |
| Oktober | von 7 ^o Uhr bis 19 ^o Uhr |
| November , Dezember | von 7 ^o Uhr bis 17 ^o Uhr |

Angelzeiten für Nichtforellenregionen/-gewässern:

| | |
|----------------------------|---|
| Januar , Februar | von 7 ^o Uhr bis 18 ^o Uhr |
| März | von 5 ^o Uhr bis 21 ^o Uhr |
| April | von 6 ^o Uhr bis 22 ^o Uhr |
| Mai , Juni , Juli , August | von 4 ^o Uhr bis 24 ^o Uhr |
| September , Oktober | von 6 ^o Uhr bis 22 ^o Uhr |
| November , Dezember | von 7 ^o Uhr bis 18 ^o Uhr, |

Schonzeiten in Forellenregion/-gewässer :

Vom 1. 9 - 15. 4. :

| | |
|--|-------------|
| pstruh obecný (Salmo trutta) | Bachforelle |
| losos obecný (atlantský) (Salmo salar) | Lachs |

Vom 16. 3 - 15. 6.

| | |
|--|-------------------------|
| ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus), | Nase |
| parma obecná (Barbus barbus), | Barbe |
| parma východní (Barbus petenyi), | |
| podoustev říční (nosák) (Vimba vimba), | Russnase |
| jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso), | Stör , Sterlet , Hausen |
| jelec jesen (Leuciscus idus), | Aland |
| jelec tloušť (Leuciscus cephalus). | Döbel |

Schonzeiten in Nichtforellenregionen/-gewässern :

Vom 1. 1- 15. 6.

| | |
|--|--------|
| bolen dravý (Aspius aspius) | Rapfen |
| candát obecný (Stizostedion lucioperca), | Zander |

jelec tloušť (Leuciscus cephalus)
sumec velký (Silurus glanis),
štika obecná (Esox lucius).

Döbel
Wels
Hecht

Vom 1. 12 do 15. 6

| | |
|--------------------------------------|-------|
| lipan podhorní (Thymallus thymallus) | Äsche |
|--------------------------------------|-------|

Vom 1. 1. do 30. 9 .

| | |
|--|--------|
| Hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) | Huchen |
|--|--------|

Vom 1. 9 do 30. 11.

| | |
|--------------------------------|-----|
| úhoř říční (Anguilla anguilla) | Aal |
|--------------------------------|-----|

Vom 1. 1 do 15. 3.

| | |
|-----------------------------|--------|
| mník jednovousý (Lota lota) | Quappe |
|-----------------------------|--------|

* für Richtigkeit und Vollständigkeit keine Haftung

Weitere Informationen in deutscher Sprache unter:

<http://www.rybsvaz.cz/?page=fischfangbedingungen&lang=de&fromIDS>